



Service de médecine nucléaire

Numéro d'identification
INFO 9

Numéro de version
1

Date d'entrée
en vigueur
20/02/2013

Page
1

LES SCINTIGRAPHIES RENALES AU MAG3/DTPA

INFORMATIONS CONCERNANT LA SCINTIGRAPHIE RENALE AU MAG3/DTPA AVEC OU SANS LASIX/CAPOTEN

Votre médecin vous a prescrit une scintigraphie :

- Au MAG3 + Lasix :

Pour cet examen, vous ne devez pas être à jeun. Il est destiné à voir si vos reins fonctionnent normalement notamment s'il n'y a pas d'obstacle à l'écoulement de l'urine. L'examen dure 1 heure.

A votre arrivée, une perfusion sera mise en place dans le pli du coude pour injecter le produit traceur lorsque nous débuterons l'examen. On vous demandera d'uriner pour vider la vessie.

Vous serez allongé sur le lit de la camera qui sera placée dans votre dos à hauteur des reins et de la vessie. Nous injecterons alors le produit traceur (aucun effet secondaire) et en même temps nous commencerons les images. Il ne faut surtout plus bouger pendant 20 minutes. Suivant ce que le médecin recherche, du lasix peut-être injecté ce qui peut provoquer le besoin d'uriner. Il faut encore tenir 20 minutes sans bouger. Après 40 minutes, l'examen est terminé et vous pouvez vous lever. Il n'y a pas d'effet secondaire à craindre.

Il est conseillé de bien boire (1.5 litre d'eau) et d'uriner fréquemment pendant 24 heures de manière à éliminer plus rapidement le produit injecté.

- Au MAG3 + Capoten

Pour cet examen, vous devez être à jeun. Il est destiné à voir si vos reins sont responsables de votre hypertension artérielle. L'examen dure 1 heure.

Lors de la prise de rendez-vous, il vous sera demandé le nom de TOUS les médicaments que vous prenez. Certains doivent absolument être arrêtés parfois durant plusieurs jours voire 1 semaine. Vous devez absolument nous prévenir de tout nouveau médicament que vous n'auriez pas signalé lors de la prise du rendez-vous, y compris les gouttes nasales pour le rhume (proscrites).



Service de médecine nucléaire

Numéro d'identification
INFO 9

Numéro de version
1

Date d'entrée
en vigueur
20/02/2013

Page
2

LES SCINTIGRAPHIES RENALES AU MAG3/DTPA

Le jour du rendez-vous, à votre arrivée, un comprimé de Capoten vous sera donné et une perfusion placée dans le pli du coude. On vous prendra la tension. Il faut attendre approximativement ½ heure que le comprimé fasse effet. On vous demandera d'uriner pour vider la vessie.

Vous serez alors allongé sur le lit de la camera qui sera placée dans votre dos à hauteur des reins et de la vessie. Nous injecterons le produit traceur (aucun effet secondaire) et en même temps nous commencerons les images. Il ne faut surtout plus bouger pendant 30 minutes. Suivant les résultats de cet examen, vous serez conviés ou non à revenir un autre jour, faire l'examen comparatif à savoir sans administration préalable de Capoten. Celui-ci dure également 30 minutes.

Il est conseillé de bien boire (1.5 litre d'eau) et d'uriner fréquemment pendant 24 heures de manière à éliminer plus rapidement le produit injecté.

Quelque soit le type de scintigraphie rénale demandée par votre médecin, le jour de l'examen, vous venez directement en médecine nucléaire muni de la demande d'examen, signée du médecin et de votre carte d'identité pour l'inscription.

A noter que l'examen est contre-indiqué chez la femme enceinte. Signalez-nous donc si vous êtes enceinte ou susceptible d'être enceinte. L'allaitement doit être suspendu durant 12 heures.

Si vous avez des questions relatives au déroulement de l'examen, n'hésitez pas à nous appeler au 061/240138 (service de médecine nucléaire de Bastogne) ou au 084/219232 (service de médecine nucléaire de Marche).

Dr LONDON Virginie